Почечные и панкреатические колики

ПОЧЕЧНАЯ КОЛИКА

Алгоритм купирования

Купирование спазма и восстановление проходимости мочеточника

- Теплая ванна
- Спазмолитики: дротаверин, платифиллин

Комбинированные лекарственные средства (спазмолитик + анальгетик + ганглиоблокатор)

Антидиуретики

Нет эффекта

Пиелонефрит, окклюзия мочеточника единственной почки

Катетеризация мочеточника, нефростомия

Купирование выраженного болевого синдрома

- Теплая ванна
- НПВП: диклофенак натрия, индометацин, кеторолак и т.д.

- Резкая боль, усиливается при попытке сменить положение тела. Область: пах, поясница, половые органы.
- Анурия/частичное затруднение мочеиспускания.
- Рвота.
- Помутнение или полная потеря сознания в момент наивысшего проявления болевого синдрома.
- Снижение артериального давления.
- Повышение температуры тела.

ПЕЧЕНОЧНАЯ И ПАНКРЕАТИЧЕСКАЯ КОЛИКИ

Алгоритм купирования

Печеночная колика. Причины:
- желчнокаменная болезнь;
- острый холецистит;
- новообразования печени.

Боль в районе правого подреберья, отдает в верхнюю часть живота, правую подлопаточную область и плечо. Сухость во рту, горечь, тошнота, рвота. Приступы боли могут длиться от нескольких минут до нескольких дней. Чаще ночью, после приема острой и жирной пищи.

Панкреатическая колика. Причины:
- острый панкреатит или хронический панкреатит в стадии обострения;
- новообразования поджелудочной железы;
- переедание, потребление жирной, мясной и острой пищи, употребление алкоголя.

Опоясывающие боли в верхней части живота. Отрыжка, рвота, понос, вздутие живота.

Обезболивающие и НПВП принимать нельзя, это сильно затруднит постановку диагноза.

Полный голод. Спазмолитики: атропина сульфат, папаверин, дротаверин, мебеверин в условиях стационара. При затянувшегмся приступе – 2 спазмолитика + метоклопрамид.
Для купирования боли в/м – метамизол натрия, кетопрофен, кеторолак.

Обезболивающие и НПВП принимать нельзя, это сильно затруднит постановку диагноза.

Покой, положение сидя с прижатыми к груди коленями, строгое голодание, ¼ стакана воды каждые 30 минут – час, на область поджелудочной железы со стороны спины – пузырь со льдом. Поверхностное дыхание поможет облегчить приступ.